Коррекция роговичного астигматизма у пациентов с тонкой роговицей с помощью усовершенствованной сочетанной технологии

М.С. Стройко

С.В. Костенев

А.Л. Пахомова

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Бескудниковский бульвар, 59а, Москва, 127486, Российская федерация

РЕЗЮМЕ

Офтальмология. 2018;15(2S):166–173

Цель исследования — проведение усовершенствованной сочетанной технологии (фемтосекундная астигматическая кератотомия и топографически-ориентированная фоторефрактивная кератэктомия), для коррекции роговичного астигматизма при тонкой роговице. **Пациенты и методы.** В статье приведен анализ данных 19 пациентов (30 глаз) с диагнозом сложный миопический астигматизм в сочетании с тонкой роговицей, которым была выполнена операция фемтосекундной астигматической кератотомии (первый этап усовершенствованной сочетанной технологии). Средние значения показателей до операции: сферический компонент рефракции $-4,1 \pm 2,1$ дптр, цилиндрический компонент рефракции $-4,9 \pm 1,4$ дптр, НКОЗ $0,1 \pm 0,05$, КОЗ $0,6 \pm 0,1$, H_{max} $46,70 \pm 1,1$, H_{min} $42,8 \pm 1,3$, толщина роговицы $470,0 \pm 12,7$ мкм. Вторым этапом тем же пациентам была проведена топографически-ориентированная фоторефрактивная кератэктомия с целью коррекции остаточной аметропии. Средние значения показателей до операции: сферический компонент рефракции $-5,3 \pm 2,0$ дптр, цилиндрический компонент рефракции $-1,6 \pm 0,8$ дптр, НКОЗ $0,3 \pm 0,1$, КОЗ $0,7 \pm 0,1$, H_{max} $44,00 \pm 0,9$, H_{min} $44,3 \pm 0,8$, толщина роговицы $464,3 \pm 8,3$ мкм. Всем пациентам, вошедшим в клиническое исследование, проведено офтальмологическое диагностическое обследование стандартными и специальными методами, скрининг кератоконуса. При проведении первого этапа усовершенствованной сочетанной технологии была использована фемтосекундная лазерная установка LenSx Laser (Alcon, США), при проведении второго этапа — эксимерлазерная установка WaveLight EX-500 (Alcon, США). **Результаты.** После завершения двух этапов усовершенствованной сочетанной технологии были получены следующие результаты: снижение сферического компонента рефракции с $-4,1 \pm 2,1$ до $-0,4 \pm 0,3$, цилиндрического компонента рефракции с $-4,9 \pm 1,4$ до $-0,1 \pm 0,1$, H_{max} с $44,70 \pm 1,1$ до $37,8 \pm 1,6$, H_{min} с $42,80 \pm 1,3$ до $37,00 \pm 1,3$, увеличение КОЗ с $0,6 \pm 0,1$ до $0,8 \pm 0,1$, НКОЗ с $0,1 \pm 0,05$ до $0,7 \pm 0,1$. **Выводы.** Усовершенствованная сочетанная технология (фемтосекундная астигматическая кератотомия и топографически-ориентированная фоторефрактивная кератэктомия) является эффективной, безопасной, позволяет выполнять коррекцию астигматизма у пациентов с тонкой роговицей, которым ранее было отказано в рефракционной операции.

Ключевые слова: астигматизм, тонкая роговица, усовершенствованная сочетанная технология, фемто-АК, фемтосекундный лазер

Для цитирования: Стройко М.С., Костенев С.В., Пахомова А.Л. Коррекция роговичного астигматизма у пациентов с тонкой роговицей с помощью усовершенствованной сочетанной технологии. Офтальмология. 2018;15(2S):166–173. <https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-2S-166-173>

Прозрачность финансовой деятельности: Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах

Конфликт интересов отсутствует

Correction of Corneal Astigmatism in Patients with a Thin Cornea by Improved Combined Technology

M.S. Stroyko, S.V. Kostenev, A.L. Pakhomova

The S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution
Beskudnikovskiy boul., 59a, Moscow, 127486, Russia

М.С. Стройко, С.В. Костенев, А.Л. Пахомова

Контактная информация: Стройко Милла Сергеевна s-milla@mail.ru

Коррекция роговичного астигматизма у пациентов с тонкой роговицей с помощью усовершенствованной...

ABSTRACT**Ophthalmology in Russia. 2018;15(2S):166–173**

Purpose: to carry out an advanced combined technology, including femtosecond astigmatic keratotomy and topographically-oriented photorefractive keratectomy in order to correct corneal astigmatism in patients with a thin cornea. Presentation and evaluation of the results of this observation. **Patients and methods.** There are data of 19 patients (30 eyes) with complex myopic astigmatism combined with a thin cornea who received the operation of femtosecond astigmatic keratotomy (the first stage of an improved combined technology). Mean values before surgery: sph -4.1 ± 2.1 (from -0.3 to -7.8) D, cyl -4.9 ± 1.4 (-3.0 to -7.3) D, UDVA 0.1 ± 0.05 (from 0.01 to 0.2) of the rows of table, CDVA 0.6 ± 0.1 (from 0.4 to 0.9) of the rows of table, H_{max} 46.70 ± 1.1 (from 44.50 to 48.50), H_{min} 42.8 ± 1.3 (from 40.00 to 44.00), the thickness of the cornea is 470.0 ± 12.7 (from 447.0 to 495.0) μ m. The second stage: topographically oriented photorefractive keratectomy was performed to the same patients with the aim of correcting residual ametropia. Mean values before surgery: sph -5.3 ± 2.0 (from -1.8 to -8.8) D, cyl -1.6 ± 0.8 (from -0.5 to -3.0) D, UDVA 0.3 ± 0.1 (from 0.1 to 0.6) rows of the table, CDVA 0.7 ± 0.1 (from 0.5 to 0.9) rows of the table, H_{max} 46.70 ± 1.1 (from 44.50 to 48.50), H_{min} 42.8 ± 1.3 (from 40.00 to 44.00), the thickness of the cornea 464.3 ± 8.3 (from 460.0 to 485.0). All patients from the study received a diagnostic examination by standard and special methods based on the S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution, a screening of the keratoconus on the scanning topograph Pentacam HR "Oculus Optikgerate GmbH", Germany was carried out. The first stage of the advanced combined technology was used the LenSx Laser ("Alcon", USA), the second stage — WaveLight EX-500 ("Alcon", USA), was used. **Results.** After the completion of two stages of improved combined technology the following results were obtained: reduction of the sph with -4.1 ± 2.1 (from -7.8 to -0.3) to -0.4 ± 0.3 (from -1.0 to 0.0), cyl with -4.9 ± 1.4 (from -7.3 to -3.0) to -0.1 ± 0.1 (from -0.5 to 0.0), H_{max} from 44.70 ± 1.1 (from 44.50 to 48.50) to 37.8 ± 1.6 (from 36.00 to 43.00), H_{min} 42.80 ± 1.3 (from 40.00 to 44.00) to 37.00 ± 1.3 (from 36.00 to 40.00), CDVA growth with 0.6 ± 0.1 (from 0.4 to 0.9) to 0.8 ± 0.1 (from 0.5 to 1.0), UDVA from 0.1 ± 0.05 (from 0.01 to 0.2) to 0.7 ± 0.1 (from 0.4 to 0.9). **Conclusion.** The improved combining technology, including femtosecond astigmatic keratotomy and topographically — oriented photorefractive keratectomy is effective and safety technology, allowing to correct of corneal astigmatism in patients with a thin cornea.

Keywords: astigmatism, thin cornea, improved combined technology, femto-AK, femtosecond laser

For citation: Stroyko M.S., Kostenev S.V., Pakhomova A.L. Correction of Corneal Astigmatism in Patients with a Thin Cornea by Improved Combined Technology. *Ophthalmology in Russia*. 2018;15(2S):166–173. <https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-2S-166-173>

Financial Disclosure: No author has a financial or property interest in any material or method mentioned

There is no conflict of interests

АКТУАЛЬНОСТЬ

Роговичный астигматизм — одна из наиболее распространенных причин снижения остроты зрения и, как следствие, сложной социальной адаптации. Пациентам с подобной аномалией рефракции сложно подобрать способ коррекции [1].

В настоящее время, несмотря на наличие множества современных нехирургических и хирургических методов, проблема коррекции роговичного астигматизма остается нерешенной. Каждый из существующих методов может успешно применяться, но каждый не лишен недостатков [2, 3].

Остается актуальным поиск совершенного метода коррекции роговичного астигматизма у пациентов с анатомически тонкой роговицей.

В литературе описаны попытки борьбы с данной патологией уже с начала второй половины XIX века, описывающие различные варианты нанесения разрезов на роговицу [4–8].

Широко известной стала операция передней дозированной кератотомии, разработанная С.Н. Федоровым и соавт. Операция заключалась в нанесении непроникающих разрезов на переднюю поверхность роговицы кусочком лезвия бритвы, впоследствии — алмазным ножом.

С появлением фемтосекундного лазера (ФС-лазера) возможности расслоения тканей роговицы без нагрева и повреждения окружающих тканей начали использовать в коррекции астигматизма.

В 2008 году появляется первая публикация L. Kiraly, в которой автор сообщает о выполнении фемтосекундной астигматической кератотомии (фемто-АК) с целью коррекции роговичного астигматизма после сквозной кератопластики с использованием ФС-лазерной установки Femtec [11].

Далее появляются сообщения о выполнении фемто-АК, в результате чего достигалось запланированное значительное снижение величины астигматизма [12–27].

Фемто-АК была признана точным, предсказуемым, эффективным, безопасным, хирургическим методом снижения величины роговичного астигматизма [11–27].

Впоследствии требуется дополнительная рефракционная операция для устранения остаточной аметропии [27, 28], что и явилось поводом для разработки новой усовершенствованной сочетанной технологии, включающей фемто-АК и топо-ФРК.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Исследование базировалось на проведении усовершенствованной сочетанной технологии у 19 пациентов (30 глаз), из них было 10 (52,6%) мужчин, 9 (47,4%) женщин в возрасте $28,9 \pm 3,1$ (24,0–34,0) года.

Пациенты находились на лечении в отделе лазерной рефракционной хирургии в период с 2015 по 2018 г.

Для проведения усовершенствованной сочетанной технологии, включающей в себя фемто-АК и топо-ФРК, проводили тщательный отбор пациентов. Для участия в клинической части данной работы были отобраны ранее не оперированные пациенты с наличием сложного

миопического астигматизма в сочетании с анатомически тонкой роговицей (по данным пахиметрии в центральной зоне роговицы толщина — менее 500 мкм).

При такой патологии, как кератоконус, роговица истончается, и появляются жалобы такого же характера, как при наличии астигматизма. Важным моментом было исключить пациентов с такой патологией роговицы.

Перед проведением офтальмологического обследования осуществляли тщательный сбор анамнеза, включавший выяснение жалоб, времени, скорости, характера и возможных причин снижения зрения, переносимость и ношение контактных линз, наличие сопутствующих аллергических и соматических заболеваний, перенесенных травм и хирургических вмешательств на органе зрения.

Всем пациентам, вошедшим в клиническое исследование, проведено офтальмологическое диагностическое обследование стандартными и специальными методами.

Из табл. 1 следует, что до проведения фемто-АК — первого этапа усовершенствованной сочетанной технологии — у пациентов были следующие значения показателей: сферический компонент рефракции $-4,1 \pm 2,1$ (от $-0,3$ до $-7,8$) дптр, цилиндрический компонент рефракции $-4,9 \pm 1,4$ (от $-3,0$ до $-7,3$) дптр, НКОЗ $0,1 \pm 0,05$ (от $0,01$ до $0,2$) строчек таблицы, КОЗ $0,6 \pm 0,1$ (от $0,4$ до $0,9$) строчек таблицы, K_{max} $46,70 \pm 1,1$ (от $44,50$ до $48,50$), K_{min} $42,8 \pm 1,3$ (от $40,00$ до $44,00$), толщина роговицы $470,0 \pm 12,7$ (от $447,0$ до $495,0$) мкм.

Таблица 1. Результаты до проведения этапов усовершенствованной сочетанной технологии

Table 1. Results before advance stages of improved combined technology

Параметр Parameter	До фемто-АК Pre-femto-AK	До топо-ФРК Pre-topo-PRK
Количество глаз Eyes, n	30	30
Мужчины Male	10 (52,6%)	10 (52,6%)
Женщины Female	9 (47,4%)	9 (47,4%)
Средний возраст, лет Average age, years	$28,9 \pm 3,1$ (24,0–34,0)	$28,9 \pm 3,1$ (24,0–34,0)
Сферический компонент, дптр Sph, D	$-4,1 \pm 2,1$ ($-0,3$ до $-7,8$)	$-5,3 \pm 2,0$ ($-1,8$ до $-8,8$)
Цилиндрический компонент, дптр Cyl, D	$-4,9 \pm 1,4$ ($-3,0$ до $-7,3$)	$-1,6 \pm 0,8$ ($-0,5$ до $-3,0$)
НКОЗ UDVA	$0,1 \pm 0,05$ (0,01–0,2)	$0,3 \pm 0,1$ (0,1–0,6)
КОЗ CDVA	$0,6 \pm 0,1$ (0,4–0,9)	$0,7 \pm 0,1$ (0,5–0,9)
Кератометрия K_{max}	$46,70 \pm 1,1$ (44,50–48,50)	$44,00 \pm 0,9$ (42,00–45,80)
Кератометрия K_{min}	$42,8 \pm 1,3$ (40,00–44,00)	$44,3 \pm 0,8$ (42,5–45,5)
Центральная толщина роговицы, мкм Central corneal thickness, μm	$470,0 \pm 12,7$ (447,0–495,0)	$464,3 \pm 8,3$ (460,0–485,0)

При наличии остаточной аметропии после проведения фемто-АК через 1 месяц пациентам был выполнен

второй этап усовершенствованной сочетанной технологии с целью докоррекции остаточной аметропии методом топо-ФРК.

В табл. 1 приведены данные до проведения топо-ФРК: сферический компонент рефракции $-5,3 \pm 2,0$ (от $-1,8$ до $-8,8$) дптр, цилиндрический компонент рефракции $-1,6 \pm 0,8$ (от $-0,5$ до $-3,0$) дптр, НКОЗ $0,3 \pm 0,1$ (от $0,1$ до $0,6$) строчек таблицы, КОЗ $0,7 \pm 0,1$ (от $0,5$ до $0,9$) строчек таблицы, K_{max} $44,00 \pm 0,9$ (от $42,00$ до $45,80$), K_{min} $44,3 \pm 0,8$ (от $42,5$ до $45,5$), толщина роговицы $464,3 \pm 8,3$ (от $460,0$ до $485,0$) мкм.

Для формирования дугообразных разрезов при фемто-АК была использована ФС лазерная установка LenSx Laser (Alcon, США). Испарение стромы роговицы при операции топо-ФРК проведено с помощью ЭЛ-установки WaveLight EX-500 (Alcon, США), входящей в состав сплит-системы, совместно с FS 200 (Alcon, США).

Анализ клинико-функциональных показателей с помощью стандартных и специальных методов проводили всем пациентам до операции фемто-АК, затем на 7-е сутки, через 1 месяц после операции фемто-АК, а также до операции топо-ФРК, после снятия МКЛ (7-е сутки после операции), через 1, 3, 6 месяцев после топо-ФРК.

В работе использованы методы параметрической и непараметрической статистики (t -критерий Стьюдента, U -критерий Уилкоксона — Манна — Уитни).

В таблицах информация представлена в виде $M \pm \sigma$.

Операцию фемто-АК выполняли при помощи ФС лазера с интегрированной системой оптической когерентной томографии (ОКТ) и с учетом циклоторсии глазного яблока. Вмешательство заключается в формировании двух дугообразных, симметричных разрезов роговицы в сильном меридиане с целью его уплощения и запланированного снижения цилиндрического компонента рефракции. Для расчета параметров разрезов использовали модифицированную номограмму для анатомически тонких роговиц. После формирования роговичных разрезов шпателем проводили ревизию для их раскрытия и контроля глубины.

Всем пациентам через 1 месяц после фемто-АК планировалось проведение второго этапа с целью докоррекции остаточной аметропии методом топо-ФРК по стандартной методике и расчетом абляции с помощью диагностической станции WaveLight Allegro Topolayzer™.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из табл. 2 следует, что через 1 неделю после фемто-АК произошло увеличение НКОЗ с $0,1 \pm 0,05$ (от $0,01$ до $0,2$) до $0,3 \pm 0,1$ (от $0,1$ до $0,5$) дптр и незначительное ее увеличение через 1 месяц после фемто-АК до $0,3 \pm 0,1$ (от $0,1$ до $0,6$) дптр; увеличение сферического компонента рефракции с $-4,1 \pm 2,1$ (от $-7,8$ до $-0,3$) до $-5,6 \pm 2,1$ (от $-9,0$ до $-1,8$) дптр. Снижение цилиндрического компонента рефракции с $-4,9 \pm 1,4$ (от $-7,3$ до $-3,0$) до $-1,75 \pm 1,0$ (от $-3,5$ до $-0,5$) дптр. Через 1 месяц после проведения фемто-АК наблюдалось увеличение КОЗ с $0,6 \pm 0,2$ (от

0,4 до 0,9) до $0,7 \pm 0,1$ (от 0,5 до 0,9). K_{max} через 1 неделю после фемто-АК снизился с $46,7 \pm 1,1$ (от 44,50 до 48,50) до $44,5 \pm 1,0$ (от 43,00 до 46,00) дптр и через месяц до $44,00 \pm 0,9$ (от 42,00 до 45,80). K_{min} увеличился с $42,8 \pm 1,3$ (от 40,00 до 44,00) до $44,2 \pm 0,8$ (от 42,00 до 45,00) дптр через 1 неделю после фемто-АК и до $43,9 \pm 1,0$ (от 42,00 до 45,50) дптр через 1 месяц.

Таблица 2. Клинико-функциональные результаты операции фемто-АК

Table 2. Clinically functional results of the operation femto-AK

Параметр Parameter	Среднее значение ($M \pm \sigma$, $n = 30$) / Mean		
	до фемто-АК pre-femto-AK	после фемто-АК / post-femto-AK	
		1 нед. / 1 week	1 мес. / 1 month
Сферический компонент, дптр Sph, D	$-4,1 \pm 2,1$ (-7,8 до -0,3)	$-5,6 \pm 2,1$ (-9,0 до -1,8)	$-5,3 \pm 2,0$ (-8,8 до -1,8)
Цилиндрический компонент, дптр Cyl, D	$-4,9 \pm 1,4$ (-7,3 до -3,0)	$-1,75 \pm 1,0$ (-3,5 до -0,5)	$-1,6 \pm 0,8$ (-3,0 до -0,5)
Центральная толщина роговицы, мкм Central corneal thickness, μm	$470,0 \pm 12,7$ (447,0 до 495,0)	$465,9 \pm 10,6$ (450,0 до 485,0)	$464,3 \pm 8,3$ (460,0 до 485,0)
Кривизна роговицы, дптр K_{max} , D	$46,7 \pm 1,1$ (44,50 до 48,50)	$44,50 \pm 1,0$ (43,00 до 46,00)	$44,00 \pm 0,9$ (42,00 до 45,80)
Кривизна роговицы, дптр K_{min} , D	$42,80 \pm 1,3$ (40,00 до 44,00)	$44,2 \pm 0,8$ (42,00 до 45,0)	$43,9 \pm 1,0$ (42,00 до 45,50)
НКОЗ UDVA	$0,1 \pm 0,05$ (0,01–0,2)	$0,3 \pm 0,1$ (0,1 до -0,5)	$0,3 \pm 0,1$ (0,1–0,6)
КОЗ CDVA	$0,6 \pm 0,1$ (0,4–0,9)	$0,6 \pm 0,2$ (0,4–0,9)	$0,7 \pm 0,1$ (0,5–0,9)
ПЭК, кл./мм ² Endothelial cell density, cell/mm ²	$2986,8 \pm 346,7$ (2458,0 до 3500,0)	$3003,2 \pm 323,5$ (2500,0 до 3500,0)	$3041,7 \pm 301,2$ (2400,0 до 3500,0)

Примечание: различия показателей до и после операции носят статистически достоверный характер $p < 0,05$, U-критерий Манна — Уитни.

Note: the differences in the parameters before and after operation carry the statistically reliable nature of the pattern $p < 0,05$, U-criterion of Mann — Whitney.

Таблица 3. Клинико-функциональные результаты операции топо-ФРК

Table 3. Clinically functional results of the operation topo-PRK

	Среднее значение ($M \pm \sigma$, $n = 30$) / Mean				
	до топо-ФРК pre-topo-PRK	после топо-ФРК / post-topo-PRK			
		7 дней / 7 days	1 мес. / 1 month	3 мес. / 3 months	6 мес. / 6 months
Сферический компонент, дптр Sph, D	$-5,3 \pm 2,0$ (-8,8 до -1,8)	$-1,4 \pm 0,7$ (-2,8 до -0,3)	$-0,7 \pm 0,4$ (-2,0 до -0,0)	$-0,4 \pm 0,3$ (-1,0 до -0,0)	$-0,4 \pm 0,3$ (-1,0 до -0,0)
Цилиндрический компонент, дптр Cyl, D	$-1,6 \pm 0,8$ (-3,0 до -0,5)	$-0,4 \pm 0,4$ (-1,0 до -0,0)	$-0,2 \pm 0,2$ (-0,5 до -0,0)	$-0,1 \pm 0,1$ (-0,5 до -0,0)	$-0,1 \pm 0,1$ (-0,5 до -0,0)
Центральная толщина роговицы, мкм Central corneal thickness, μm	$464,3 \pm 8,3$ (485–450)	$357,0 \pm 23,8$ (300–400)	$360,5 \pm 24,1$ (300–410)	$360,5 \pm 23,8$ (305,4–405)	$359,7 \pm 23,0$ (305–410)
Кривизна роговицы, дптр K_{max} , D	$44,00 \pm 0,9$ (42,0–45,8)	$38,0 \pm 1,5$ (36,0–43,0)	$37,8 \pm 1,7$ (36,0–43,0)	$37,9 \pm 1,7$ (36,0–43,5)	$37,8 \pm 1,6$ (36,0–43,0)
Кривизна роговицы, дптр K_{min} , D	$43,9 \pm 1,0$ (42,0–45,5)	$37,0 \pm 1,3$ (36,0–40,0)	$37,0 \pm 1,3$ (36,0–40,0)	$37,1 \pm 1,3$ (36,0–40,5)	$37,0 \pm 1,3$ (36,0–40,0)
НКОЗ UDVA	$0,3 \pm 0,1$ (0,1–0,6)	$0,5 \pm 0,1$ (0,3–0,8)	$0,6 \pm 0,1$ (0,4–0,8)	$0,6 \pm 0,1$ (0,4–0,8)	$0,7 \pm 0,1$ (0,4–0,9)
КОЗ CDVA	$0,7 \pm 0,1$ (0,5–0,9)	$0,7 \pm 0,1$ (0,5–0,9)	$0,7 \pm 0,1$ (0,5–1,0)	$0,8 \pm 0,1$ (0,5–1,0)	$0,8 \pm 0,1$ (0,5–1,0)
ПЭК, кл./мм ² Endothelial cell density, cell/mm ²	$3041,7 \pm 301,2$ (2400,0–3500,0)	$2993,0 \pm 304,4$ (2400,0–3450,0)	$3000 \pm 290,4$ (2450,0–3500,0)	$2999,7 \pm 290,4$ (2400,0–3450,0)	$3011,7 \pm 300,2$ (2400,0–3500)

Примечание: различия показателей до и после операции носят статистически достоверный характер $p < 0,05$, U-критерий Манна — Уитни.

Note: the differences in the parameters before and after operation carry the statistically reliable nature of the pattern $p < 0,05$, U-criterion of Mann — Whitney.

После проведения второго этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК) 19 пациентам (30 глаз) на 4 глазах (13,3%) возникло нестойкое временное помутнение прозрачной роговицы (хейз) в зоне абляции, что снизило качество зрения и не позволило достигнуть максимально возможной остроты зрения сразу после операции.

ОБСУЖДЕНИЕ

Через 1 месяц после проведения первого этапа усовершенствованной сочетанной технологии (фемто-АК) наблюдался стойкий рефракционный эффект. Произошло запланированное снижение величины цилиндрического компонента рефракции в среднем на 4 дптр и прогнозируемое компенсаторное незначительное уве-

личение сферического компонента рефракции в среднем на 1 дптр, что отражено на рис. 1а.

После выполнения второго этапа усовершенствованной сочетанной технологии топо-ФРК с целью устранения остаточной аметропии отмечено снижение сферического и цилиндрического компонентов рефракции в среднем на 5 и 1,5 дптр, соответственно, к 3-му месяцу после операции, что показано на рис. 1б.

В результате проведения двух этапов усовершенствованной сочетанной технологии был получен стабильный рефракционный эффект с незначительной величиной остаточной аметропии компонентов рефракции: сфера $-0,4 \pm 0,3$ (от $-1,0$ до $0,0$), цилиндр $-0,1 \pm 0,1$ ($-0,5 \dots -0,0$).

На рис. 2а показано, что после проведения I этапа усовершенствованной сочетанной технологии (фемто-

Рис. 1. Динамика сферического и цилиндрического компонентов рефракции до и после проведения: а. I этапа усовершенствованной сочетанной технологии (фемто-АК); б. II этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК)

Fig. 1. Dynamics of the spherical and cylindrical components of refraction before and after: а. I stage of improved combined technology (femto-АК); б. II stage of improved combined technology (topo-PRK)

Рис. 2. Динамика НКОЗ и КОЗ до и после проведения: а. I этапа усовершенствованной сочетанной технологии (фемто-АК); б. II этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК)

Fig. 2. Dynamics of the UDVA and CDVA before and after: а. I stage of improved combined technology (femto-АК); б. II stage of improved combined technology (topo-PRK)

АК) уже через 1 неделю произошло увеличение НКОЗ на 2 строки таблицы и КОЗ на 1 строку к 1-му месяцу после операции.

После проведения II этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК) значения данных показателей возросли: НКОЗ — постепенно на 4 строки таблицы к 6-му месяцу после топо-ФРК и КОЗ — на 1 строку к 3-му месяцу, что показано на рис. 2b.

Имело место значительное уменьшение иррегулярности поверхности роговицы после проведения I этапа усовершенствованной сочетанной технологии за счет

уплощения «сильного» меридиана и компенсаторного усиления «слабого», что отражает рис. 3a.

Показатели кератометрии после II этапа операции также снизились, при этом поверхность роговицы сохранила свою равномерность (рис. 3b).

После проведения I этапа усовершенствованной сочетанной технологии не наблюдалось изменений в толщине роговицы, так как операция происходила без затраты тканей роговой оболочки глаза, что особо ценно для пациентов с анатомически тонкой роговицей (рис. 4a). Ее значения снижаются в среднем на 100 мкм после проведения

Рис. 3. Динамика кератометрических показателей до и после проведения: а. I этапа усовершенствованной сочетанной технологии (фемто-АК); б. II этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК)

Fig. 3. Dynamics of the corneal keratometry parameters before and after: a. I stage of improved combined technology (femto-AK); b. II stage of improved combined technology (topo-PRK)

Рис. 4. Центральная толщина роговицы до и после проведения: а. I этапа усовершенствованной сочетанной технологии (фемто-АК); б. II этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК)

Fig. 4. Central cornea thickness before and after: a. I stage of improved combined technology (femto-AK); b. II stage of improved combined technology (topo-PRK)

Рис. 5. ПЭК до и после проведения: а. I этапа усовершенствованной сочетанной технологии (фемто-АК); б. II этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК)

Fig. 5. Endothelial cell density before and after: a. I stage of improved combined technology (femto-PRK); b. II stage of improved combined technology (topo-PRK)

II этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК) в связи с испарением тканей стромы роговицы. При этом величина резидуальной стромы составляет более 300 мкм, что отражено на рис. 4б.

Плотность клеток эндотелия после проведения I и II этапов усовершенствованной сочетанной технологии остается неизменной (рис. 5а, б), что доказывает безопасность данной методики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение фемто-АК для коррекции роговичного астигматизма с помощью ФС лазерной установки и с учетом циклоторсии глазного яблока эффективно и безопасно.

Интраоперационный контроль с помощью ОКТ способствует снижению риска возникновения осложнений, а именно перфорации роговицы.

Учет циклоторсии при проведении фемто-АК способствует увеличению точности предсказуемости данной операции.

Через 1 месяц после фемто-АК наблюдался стабильный, стойкий рефракционный эффект.

Проведение второго этапа усовершенствованной сочетанной технологии (топо-ФРК) у пациентов с тонкой роговицей устраняет остаточную аметропию.

Усовершенствованная сочетанная технология безопасна, эффективна. Это единственная методика по коррекции рефракции в тех ситуациях, когда невозможно провести эксимер-лазерную абляцию из-за недостаточной толщины роговицы.

УЧАСТИЕ АВТОРОВ:

Стройко М.С. — концепция и дизайн исследования, сбор, анализ, интерпретация данных, статистическая обработка материала, написание текста, подготовка иллюстраций;

Костенев С.В. — концепция и дизайн исследования, проведение операций, редактирование, критический пересмотр в части значимого интеллектуального содержания, окончательное одобрение варианта статьи для опубликования;

Пахомова А.Л. — концепция исследования, редактирование, критический пересмотр статьи в части значимого интеллектуального содержания, одобрение варианта статьи для опубликования.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Дoga A.B., Myшкова И.А., Kаримова A.H., Kечин E.B. Клинико-функциональные результаты операции фемтолазик по технологии «Т-САТ» в коррекции сложного миопического астигматизма. *Вестник Волгоградского государственного медицинского университета*. 2017;1(61):95–97. [Doga A.V., Mushkova I.A., Karimova A.N., Kechin E.V. Visual outcomes of the topography-guided femtolasik in myopic astigmatism correction. *Journal of Volgograd State University=Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2017;1(61):95–97. (In Russ.)]
2. Демчинский А.М., Myшкова И.А., Кишкин Ю.И., Майчук Н.В. Дифференцированный подход к выбору технологий суббоуменового фемтокератомилеза с тканесохраняющим и стандартным алгоритмами абляции с учетом диаметра зрачка и зоны абляции в коррекции миопии высокой степени. *Практическая медицина*. 2016;1;2 (94):113–117. [Demchinsky A.M., Mushkova I.A., Kishkin Yu.I., Maychuk N.V. A differentiated approach to the selection of technologies of the sub-Bowman's femtokeratomeileus with tissuesaving and standard ablation, taking into account the diameter of the pupil and the ablation zone in the correction of high myopia. *Practical medicine=Prakticheskaya meditsina*. 2016;1;2 (94):113–117. (In Russ.)]
3. Дoga A.B., Myшкова И.А., Семенов A.Д., Kаримова A.H., Kечин E.B. Этапы развития и современные аспекты кераторефракционной хирургии. *Практическая медицина*. 2016;6(98):36–41. [Doga A.V., Mushkova I.A., Semenov A.D., Karimova A.N., Kechin E.V. Stages of development and modern aspects of keratorefractive surgery. *Practical medicine=Prakticheskaya meditsina*. 2016;6(98):36–41. (In Russ.)]
4. Snellen H. Die Richtung der hauptmeridiane des astigmatischen auges. *Arch. Ophthalmol.* 1869;XV(2):199–207.
5. Schiotz L. Ein fall von hochgradigem horn hautastigmatismus nach starextraction. *Arch. Augenheilkd.* 1885;15:178.
6. Bates W.H. A suggestion of an operation to correct astigmatism. *Arch. Ophthalmol.* 1894;23:9–13.
7. Lucciola J. Traitement chirurgical de l'astigmatisme. *Arch. Ophthalmol.* Paris. 1896; XVI: 630–8.
8. Lans L.J. Experimentelle untersuchungen ube entstehung von astigmatismus durch nicht-perforierende corneawunden. *Albrecht v. Graefes Arch. Ophthalm.* 1898;45:117–52.
9. Barner S.S. Surgical induction of corneal astigmatism (an experimental study). *Albrecht v. Graefes Arch. Ophthalm.* 1977;201(3):213–20.
10. Boucher C., Laflamme M. Correction chirurgicale de l'astigmatisme corneae apres greffe de cornee. *Canad. J. Ophthalm.* 1979;14(2): 81–4.
11. Kiraly L. Korrektur des Astigmatismus nach Hornhauttransplantation durch bogenformige inzisionen mit dem Femtosekundenlaser. *Klin. Monatsbl Augenheilkd.* 2008;225:70–4. DOI: 10.1055/s-2008-1027126
12. Bahar I., Levinger E., Kaiserman I., Sansanayudh W., Rutman D.S. IntraLase-enabled astigmatic keratotomy for post-keratoplasty astigmatism. *Am. J. Ophthalmol.* 2008;146:897–904.
13. Harissi-Dagher M., Azar D.T. Femtosecond laser astigmatic keratotomy for postkeratoplasty astigmatism. *Can. J. Ophthalmol.* 2008;43:367–9. DOI: 10.3129/i08-043

14. Kymionis G.D., Yoo S.H., Ide T., Culbertson W.W. Femtosecond-assisted astigmatic keratotomy for post-keratoplasty irregular astigmatism. *J. Cataract Refract. Surg.* 2009;35:11–3. DOI: 10.1016/j.jcrs.2008.08.039
15. Nubile M., Carpineto P., Lanzini M., Calienno R., Agnifili L., Ciancaglini M., Mastropasqua L. Femtosecond laser arcuate keratotomy for the correction of high astigmatism after keratoplasty. *Ophthalmology.* 2009;116:1083–92. DOI: 10.1016/j.opht.2009.01.013. Epub 2009 Apr 23
16. Buzzonetti L., Petrocelli G., Laborante A., Mazzilli E., Gaspari M., Valente P. Arcuate keratotomy for high postoperative astigmatism performed with the IntraLase femtosecond laser. *J. Refract. Surg.* 2009;25:709–14.
17. Levinger E., Bahar I., Rootman D.S. IntraLase-enabled astigmatic keratotomy for correction of astigmatism after Descemet stripping automated endothelial keratoplasty: a case report. *Cornea.* 2009;28:1074–6. DOI: 10.1097/ICO.0b013e318199fa2c
18. Yoo H. Sonia, Kymionis George D., Ide Takeshi, Diakonis Vasilios D. Overcorrection after femtosecond-assisted astigmatic keratotomy in a post-Descemet-stripping automated endothelial keratoplasty patient. *J. Cataract Refract. Surg.* 2009;35:1833–4.
19. Kumar N.L., Kaiserman I., Shehaseh-Mashor R., Sansanayudh W., Rutman D.S. IntraLase-enabled astigmatic keratotomy for post-keratoplasty astigmatism: on-axis vector analysis. *Ophthalmology.* 2010;117:1228–35. DOI: 10.1016/j.opht.2009.10.041
20. Volkan Hurmeric, Sonia H. Yoo. Femtosecond-Assisted Astigmatic Keratotomy. *J. Cataract Refract. Surg.* 2010;10:30–2.
21. Kook D. Astigmatische Keratotomie mit dem Femtosekundenlaser. *Korrektur hoher Astigmatismen nach Keratoplastik Ophthalmol.* 2011;108:143–50.
22. Vaddavalli Pravin K., Hurmeric Volkan, Yoo Sonia H. Air bubble in anterior chamber as indicator of full-thickness incisions in femtosecond-assisted astigmatic keratotomy. *J. Cataract Refract. Surg.* 2011;37:1723–5. DOI: 10.1016/j.jcrs.2011.06.022
23. Fadlallah Ali, Mehanna Chadi, Saragoussi Jean-Jacques, Chelala Elias, Amari Belkacem, Legeais Jean-Marc. Safety and efficacy of femtosecond laser-assisted arcuate keratotomy to treat irregular astigmatism after penetrating keratoplasty. *J. Cataract Refract. Surg.* 2015;41:1168–75. DOI: 10.1016/j.jcrs.2014.08.046
24. Omer Trivizki, Levinger Eliya, Levinger Samuel. Correction ratio and vector analysis of femtosecond laser arcuate keratotomy for the correction of post-mushroom profile keratoplasty astigmatism. *J. Cataract Refract. Surg.* 2015;41:1973–9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2015.10.011>
25. Nejima Ryohei, Terada Yukiko, Mori Yosai. Clinical utility of femtosecond laser-assisted astigmatic keratotomy after cataract surgery. *Jpn. J. Ophthalmol.* 2015; DOI: 10.1007/s10384-015-0383-3
26. Sabaany Nasser Al, Malki Salem Al, Jindan Mohana Al, Assiri Abdullah Al, Swailem Samar Al. Femtosecond astigmatic keratotomy for postkeratoplasty astigmatism. *Saudi Journal of Ophthalmology.* 2016; DOI: 10.1016/j.sjopt.2016.04.003
27. Ryan M. St. Clair, Anushree Sharma, David Huang, Fei Yu, Yakov Goldich, David Rootman, Sonia Yoo, Florence Cabot, Jason Jun, Lijun Zhang, Anthony J. Aldave Development of a nomogram for femtosecond laser astigmatic keratotomy for astigmatism after keratoplasty. *J. Cataract Refract. Surg.* 2016;42:556–62. DOI: 10.1016/j.jcrs.2015.12.053
28. Догa A.B., Кишкин Ю.И., Майчук Н.В., Бранчевская Е.С. Топографически ориентированная ФРК — метод выбора при коррекции индуцированной иррегулярности глазной поверхности высокой степени. *Офтальмохирургия.* 2012;3:8–11. [Doga A.V., Kishkin Y.I., Maychuk N.V., Branchevskaya E.S. Topography-guided PRK for irregular astigmatism correction in keratoconus patients. *Ophthalmosurgery.* 2012;3:8–11. (In Russ.)]

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Стройко Милла Сергеевна
аспирант
Бескудниковский бульвар, 59а, Москва, 127486, Российская Федерация

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Костенев Сергей Владимирович
доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела лазерной рефракционной хирургии
Бескудниковский бульвар, 59а, Москва, 127486, Российская Федерация

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Пахомова Анна Леонидовна
кандидат медицинских наук, заведующая отделением лазерной рефракционной хирургии
Бескудниковский бульвар, 59а, Москва, 127486, Российская Федерация

ABOUT THE AUTHORS

S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution
Stroyko Milla S.
postgraduate
Beskudnikovsky boulevard, 59a, Moscow, 127486, Russia

S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution
Sergey V. Kostenev
MD, PhD, senior researcher
Beskudnikovsky boulevard, 59a, Moscow, 127486, Russia

S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution
Anna L. Pakhomova
PhD
Beskudnikovsky boulevard, 59a, Moscow, 127486, Russia